CONVIS LUXEMBOURG

Anhang Newsletter 13:

Zwischenfruchtanbau (im Wasserschutzgebiet)

Gräser und Getreide	späteste Aussaatzeit	Saatstärke (kg/ha)	Zur Fütterung geeignet	Winterhart	Eigenschaften
Hybrid-Raygras	Mitte August	40	ja	ja	überjährig, mässig frostempfindlich, gutes Futtergras im Frühjahr,
westerwoldisches Raygras diploid und tetraploid	Mitte August	35	ja	ja	überjährig einjährig, mässig frostempfindlich, gutes Futtergras im Frühjahr,
Italienisches Raygras diploid oder tertaploid als Sommerzwischenfrucht	Mitte August	40	ja	ja	überjährig mehrjährig, mässig frostempfindlich, gutes Futtergras im Frühjahr,
Hafer	Anfang September	120	ja	nein	gut auf feuchten Standorten,bei früher Saat Futternutzung noch möglich
Grünroggen	Ende September	160	ja	ja	gute Durchwurzelung, überjährig, wenig empfindlich bei Trockenheit, anspruchslos
Leguminosen					
Inkarnatklee	Anfang August	25	ja	ja	überjährig, wärmeliebend, kalkhaltige Böden, bildet Pfahlwurzel
Perserklee	Mitte August	15	ja	nein	Einjährig, abfrierend, verträgt Sommertrockenheit
Sommerwicken	Mitte August	60	ja	nein	Geringe Standortansprüche, kalkhaltiger Boden
Futtererbsen	Mitte August	140	ja	nein	mittelfeuchte Böden, nicht für sehr trockene Standorte geeignet
Winterwicken	Mitte September	80	ja	ja	winterhart, feuchtwarmer Herbst und trockener Frühling
Lupinen	Anfang August	170	bedingt	nein	**weisse Lupine:** kalkhaltige, warme Böden; **blaue Lupine:** neutral bis schwach saure Böden; **gelbe Lupine:** kalkfeindlich
Kreuzblüter					
Sommerfutterraps	Ende August	12	ja	nein	spätsaatverträglich, abfrierend
Winterfutterraps	Ende August	12	ja	ja	als Gründüngungspflanze geringe Bodenansprüche, kräftige Pfahlwurzel
Gelbsenf	Mitte September	15	ja	nein	anspruchslos, Saat bis mitte September,
Ölrettich	Mitte September	15	ja	nein	Einjährig, abfrierend, spätsaatverträglich
Winterrübsen	Anfang September	12	ja	ja	spätsaatverträglich, anspruchslos, zur Fütterung geeignet
Stoppelrüben	Anfang September	1	ja	frostverträglich bis -10°C	gutes Wurzelsystem, weide- und siliertauglich

Sonstige Pflanzen					
Phacelia	Mitte August	10	bedingt	nein	anspruchslos, läuft auch bei Trockenheit noch gut auf
Buchweizen	Mitte August	60	nein	nein	läuft auch bei Trockenheit gut auf, frostempfindlich
Pflanzengemische					
Landsberger Gemenge	Mitte August	50	ja	ja	ertrag- und eiweißreiche Winterzwischenfrucht, für fast alle Böden geeignet, hohe Grün- und Trockenmasseerträge mit exzellentem Futterwert und hohe Wurzelmasse, Aufwuchs kann beweidet, geschnitten, frisch verfüttert, siliert oder als Grünbrache gemulcht werden
Hafer/Erbsen	Mitte August/Anfang September	50/50	ja	nein	schnellwüchsig, zur Fütterung geeignet
Hafer/Erbsen/Wicken/ westerwoldisches Raygras	Mitte August/Anfang September	60/20/10/15	ja	Teilweise abfrierend	durch Raygras überjährig, ein Schnitt im Herbst und Frühjahr
Mais Pro	Ende August	45	nein	Teilweise abfrierend	Unterschiedliche fertige Mischungen von DSV (weitere Infos unter http://www.dsv-saaten.de/zwischenfruechte
N FIXX	Mitte August	45	nein	nein	
Rigol	Mitte/Ende August	50	nein	ja	
Biomax	Juli/August	25	nein	nein	
Aqua Pro	Mitte August	25	nein	nein	
Wickroggen (Winterwicken/Grünroggen)	Mitte August	10/90	ja	ja	anspruchslos, auch auf trockenen Standorten, wurzelt tief
Italienisches Raygras/Winterraps	Mitte August	25/1	ja	ja	überjährig, Raps entwickelt sich schnell und sorgt für Beschattung, gute Siliereigenschaften

Falls Sie Fragen zur GAP-Reform haben oder wissen möchten, wie groß Ihre Greeningfläche sein muss, bzw. ob Sie ökologische Ausgleichsflächen anlegen müssen, melden Sie sich bitte bei uns, sodass wir es gemeinsam ermitteln können.

4, Zone Artisanale & Commerciale • L-9085 Ettelbruck • Tel.: 26 81 20-0 • Fax: 26 81 20-12 • www.convis.lu • info@convis.lu